

CYSTUS 052 INFEKTBLOCKER®

Medizinprodukt | Dispositif medical | Medical device
erhältlich in | disponible en | available in BE | LU | NL

glutenfrei | sans gluten | gluten free
lactosefrei | sans lactose | lactose free
vegan | végétalien | vegan

Cystus 052 Infektblocker® – Classic

66 Stück | Blister
132 Stück | Blister

CNK 4252466
CNK 4252474

Cystus 052 Infektblocker® Honing-Orange | Miel-Orange

66 Stück | Blister
132 Stück | Blister

CNK 4252490
CNK 4252482



▪ Zweckbestimmung:

Cystus 052 Infektblocker® ist eine Lutschtablette zur Anwendung im Mund-Rachenraum und dient der Vorbeugung sowie der begleitenden Behandlung von Viruserkrankungen und bakteriellen Infektionen der oberen Atemwege, unter

anderem solcher, die durch Grippe- und Erkältungserreger verursacht werden. Bakterien und Viren werden unspezifisch physikalisch gebunden und so weitgehend am Eindringen in die Körperzellen gehindert.

▪ Domaine d'utilisation:

Cystus 052 Infektblocker® est une pastille qu'on laisse fondre dans la bouche et agir dans la cavité oropharyngée pour la prévention ou le traitement d'accompagnement de maladies virales et d'infections bactériennes des voies respiratoires supérieures, entre autre celles causées par les virus de grippe ou de rhume.

Les bactéries et les virus sont en large mesure capturés physiquement, et ainsi empêchés de s'introduire dans les cellules du corps.

▪ Intended use:

Cystus 052 Infektblocker® is a lozenge for use in the mouth and throat area and is used for the prevention and accompanying treatment of viral diseases and bacterial infections of the upper respiratory tract, among others those caused by influenza and colds.

Bacteria and viruses are non-specifically physically bound and thereby mostly prevented from entering the body cells.

▪ Anwendung und Dosierung:

Vorbeugend bei erhöhtem Infektrisiko, insbesondere kurz vor und während des Aufenthalts in gut besuchten öffentlichen Bereichen (z. B. in der Schule, im Kaufhaus, in öffentlichen Verkehrsmitteln), im Abstand von 60 bis 90 Minuten 1 – 2 Tabletten langsam im Mund zergehen lassen. Zur unterstützenden Therapie bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum gleichmäßig über den Tag verteilt 6 x täglich 1 – 2 Tabletten langsam im Mund zergehen lassen.

▪ Dosage et mode d'emploi:

Utilisation préventive en présence d'un risque accru d'infection, en particulier peu avant et pendant le séjour dans une zone publique à forte fréquentation (par exemple à l'école, dans les grands magasins, dans les transports publics): laisser fondre lentement 1 ou 2 pastille(s) dans la bouche toutes les 60 à 90 minutes. Utilisation en tant que traitement d'appoint lors d'inflammations de la cavité oropharyngée: laisser fondre lentement 1 ou 2 pastille(s) dans la bouche 6 fois par jour, en répartissant les prises sur la journée.


▪ Use and dosage:

As a preventive measure in case of an increased risk of infection, especially shortly before and during the stay in well-attended public areas (e. g. at school, in department stores, on public transport), let 1 – 2 tablets slowly melt in the mouth at intervals of 60 to 90 minutes. As a supportive therapy for inflammation of the mouth and throat, let 1 – 2 tablets slowly dissolve in the mouth 6 times a day, spread evenly throughout the day.



A HOHE VIRUSLAST

charge virale élevée | high viral load




ERKRANKUNG
Maladie | disease



B CYSTUS 052 INFEKTBLOCKER® SENKT VIRUSLAST

CYSTUS 052 Infektblocker® réduit la charge virale
CYSTUS 052 Infektblocker® reduces viral load



KEINE ERKRANKUNG
Pas de maladie | no disease



Virus



menschliche Zelle | cellule humaine | human cell



CYSTUS 052 Infektblocker®



Blockierung des Viruseintritts | Blocage de l'entrée du virus | Blocking of virus entry